

DOSER ET APPLIQUER des appâts rodenticides en gel prêt à l'emploi

avec Zapi

UN GEL ALIMENTAIRE PRÊT À L'EMPLOI EST UN APPÂT RODONTICIDE QUI S'APPLIQUE AVEC UN PISTOLET À SILICONE STANDARD. ZAPI FAIT DANS CETTE RUBRIQUE LA DÉMONSTRATION DE LA MISE EN PLACE DE CETTE SOLUTION, AVEC LE BRODITOP® GEL.

Ce produit universel pour le contrôle des rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) et des souris (*Mus musculus*) en milieu rural et urbain, est une formulation fortement appétente à base de sucre, huiles végétales et farines alimentaires, contenant du Brodifacoum à 50 ppm, un principe actif qui agit efficacement en une seule ingestion. Cet appât en gel crémeux a une stabilité, un goût et une adhérence élevés qui permettent une application dans les endroits difficiles d'accès.

PORTEZ VOS EQUIPEMENTS DE SECURITE



PORT OBLIGATOIRE
D'ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION DES
MAINS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 cartouche de 300 g de Broditop® Gel
- 1 pistolet à silicone standard (non fourni)
- Un cutter ou un couteau tranchant
- 1 paire de gants en latex
- Le manuel d'utilisation

1. APRÈS AVOIR MIS VOS GANTS, TAILLEZ EN « BISEAU » L'EXTRÉMITÉ DU TUBE (AU MILIEU DE LA PARTIE « VIDE » SANS CONTACT AVEC LE PRODUIT).



2. MUNISSEZ-VOUS D'UN PISTOLET À SILICONE ET INSTALLEZ LE TUBE À L'INTÉRIEUR.



3. DISPOSEZ LE GEL DANS LES POSTES D'APPÂTAGE (A) OU BIEN DANS DES STATIONS D'APPÂTS COUVERTES (B) EN RESPECTANT LES DOSES D'EMPLOI RECOMMANDÉES : UN COUP DE PISTOLET ÉQUIVAUT À 10 G DE PRODUIT.



A) POSTE D'APPÂTAGE

POUR UNE FAIBLE INFESTATION DE RATS (*RATTUS NORVEGICUS* ET *RATTUS RATTUS*), METTRE JUSQU'À 100 G DE PRODUIT PAR POINT D'APPÂT ESPACÉS DE 10 M ET JUSQU'À 100 G DE PRODUIT PAR POINT D'APPÂT ESPACÉS DE 5 M SI L'INFESTATION EST FORTE.

POUR UNE FAIBLE INFESTATION DE SOURIS (*MUS MUSCULUS*), METTRE JUSQU'À 50 G DE PRODUIT PAR POINT D'APPÂT ESPACÉS DE 5 M ET JUSQU'À 50 G DE PRODUIT PAR POINT D'APPÂT ESPACÉS DE 2 M SI L'INFESTATION EST FORTE.



B) EXEMPLE DE STATION D'APPÂTS COUVERTE : TUBE PVC D'ENVIRON 50 CM (METTRE LE GEL AU MILIEU DU TUBE, SANS ACCÈS AUX ANIMAUX NON CIBLES)



4. POSITIONNEZ LES APPÂTS EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (AUTOUR DES BÂTIMENTS)





*NB : EXEMPLES DE POINT D'APPÂTS
COUVERTS ET PROTÉGÉS : FAUX PLA-
FONDS, DOUBLES CLOISONS, COMBLES...*

*5. LES POSTES D'APPÂTAGE DOIVENT ÊTRE INSPECTÉS TOUS LES 2 À 3 JOURS (POUR LES SOURIS)
ET TOUS LES 5 À 7 JOURS (POUR LES RATS) APRÈS LE DÉBUT DU TRAITEMENT, PUIS AU MOINS UNE
FOIS PAR SEMAINE PAR LA SUITE, DANS LE BUT DE VÉRIFIER SI L'APPÂT EST ACCEPTÉ ET DE RETIRER
LES CADAVRES DE RONGEURS. NE PAS UTILISER AU-DELÀ DE 35 JOURS D'APPLICATION.*

*ESSAI TERRAIN RÉALISÉ EN SEPTEMBRE 2018 SUR UN RAT BRUN AVEC IZINATION,
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE ET EXPERTE DANS LA RÉALISATION D'ESSAIS TERRAIN CONTRE
LES ESPÈCES INVASIVES, RAVAGEURS ET LES AGENTS PATHOGÈNES.*



UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

CREDIT PHOTOS: ZAFI